



КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ БЕШЕНСТВА



БЕШЕНСТВО – ОСОБО ОПАСНАЯ ИНФЕКЦИЯ, КОТОРАЯ ПОРАЖАЕТ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ, ВЫЗЫВАЯ ТЯЖЕЛЫЕ НАРУШЕНИЯ, ПРИВОДЯЩИЕ К ГИБЕЛИ

ЕЖЕГОДНО В РОССИИ 380 – 450 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПОДВЕРГАЮТСЯ НАПАДЕНИЮ ЖИВОТНЫХ

ИСТОЧНИКИ ИНФЕКЦИИ

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ

- ПРИ УКУСЕ
- ПРИ ПОПАДАНИИ ЗАРАЖЕННОЙ СЛЮНЫ ЖИВОТНОГО НА ПОВРЕЖДЕННЫЕ КОЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ И СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ

СИМПТОМЫ:

- ЖЖЕНИЕ И ОНЕМЕНИЕ В ОБЛАСТИ УКУСА
- БЕСПОКОЙСТВО, СТРАХ, БЕССОННИЦА
- ОДЫШКА, СУДОРОГИ МЫШЦ ГЛОТКИ
- ГИДРОФОБИЯ, АЭРОФОБИЯ, АКУСТИКОФОБИЯ
- СЛЮНОТЕЧЕНИЕ, АГРЕССИЯ
- ПАРАЛИЧ МЫШЦ ЛИЦА, ЯЗЫКА, КОНЕЧНОСТЕЙ
- ПАРАЛИЧ ДЫХАТЕЛЬНЫХ И СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦ

БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК НЕ ЗАРАЗЕН

ДИКИЕ ЗВЕРИ



ЛЕТУЧИЕ МЫШИ



БЕЗНАДЗОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

СОБАКИ



КОТЫ



ГРЫЗУНЫ



ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА

УСПЕХ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ БЕШЕНСТВА ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО БЫСТРО НАЧАТО ЛЕЧЕНИЕ!

АНТИРАБИЧЕСКУЮ ВАКЦИНУ ВВОДЯТ 6 РАЗ:

1. В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ К ВРАЧУ (0-й ДЕНЬ)
2. НА 3-й ДЕНЬ
3. НА 7-й ДЕНЬ
4. НА 14-й ДЕНЬ
5. НА 30-й ДЕНЬ
6. НА 90-й ДЕНЬ



ЕСЛИ ЗА УКУСИВШИМ ЖИВОТНЫМ УСТАНОВЛЕНО НАБЛЮДЕНИЕ, И В ТЕЧЕНИЕ 10 СУТОК ПОСЛЕ УКУСА ОНО ОСТАЛОСЬ ЗДОРОВЫМ, ТО ДАЛЬНЕЙШИЕ ИНЪЕКЦИИ ПРЕКРАЩАЮТ



ПРИ НАЛИЧИИ ПОКАЗАНИЙ, КРОМЕ ВАКЦИНЫ ОДНОКРАТНО ВВОДЯТ АНТИРАБИЧЕСКИЙ ИММУНОГЛОБУЛИН